

اور کوڈ بچے

پہلے سے بچے کے لئے چوکس رہیں

اگر آپ کے بچے کو اس فہرست سے کوئی علامات ہیں تو ، یہ تجویز کی جاتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو گھر میں رکھیں اور دوسرے لوگوں سے رابطے سے گریز کریں۔ چوبیس گھنٹے انتظار کریں اور ارتقاء کا دوبارہ جائزہ لیں۔

فیصلہ / Québec.ca دیکھ بھال یا اسکول ، جس میں اسکول ڈے کیئر بھی شامل ہے ، کو واپس کرنے سے پہلے ، ہم آپ کو سازوین 19 پر تشخیص کے آلے کو استعمال کرنے یا کال کرنے کے لئے دعوت دیتے ہیں۔ 18776444545 اور ان ہدایات پر عمل کہ آپ کے بچے کی جانچ کی جانی چاہئے یا وہ اپنے ڈے کیئر یا اسکول میں واپس کرنا جو آپ کو دینے جائیں گے یہ جاننے کے لئے جاسکتا ہے۔

بخار	عام علامات	عام علامات	معدے کی علامات
 <p>بخار</p> <p>• پانچ صفر سال کی عمر کا بچہ۔ • اور اس 38.5 C (101.3 ° F) سے اوپر کا ملاشی درجہ (حرارت اڑتیس)</p> <p>•: سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچے • اور اس 38.1 ° C (100.6 ° F) سے اوپر کا زبانی درجہ حرارت تیس آٹھ</p>	 <p>عام علامات</p> <p>• ناک کی بھیڑ کے بغیر ، بغیر کسی ذائقہ کے نقصان کے اچانک بدبو آنا</p> <p>• بھوک کا اہم نقصان</p> <p>• عام پٹھوں میں درد (جسمانی مشقت سے متعلق نہیں)</p> <p>• بڑی تھکاوٹ</p>	 <p>عام علامات</p> <p>• کھانسی (نیا یا بدتر)</p> <p>• سانس کی قلت ، سانس لینے میں دشواری</p> <p>• بہتی ہوئی یا بھری ناک</p> <p>• گلے کی سوزش</p>	 <p>معدے کی علامات</p> <p>• متلی</p> <p>• قے کرنا</p> <p>• اسہال</p> <p>• پیٹ میں درد</p>

اپنے بچے کو اسکول ، اسکول ڈے کیئر یا تعلیمی بچوں کی دیکھ

بھال پر مت چھوڑیں

- اگر آپ کو محکمہ صحت سے اپنے آپ کو گھر سے الگ تھلگ کرنے کے لئے ہدایات موصول ہوئی ہیں (آپ کا بچہ نیز اس کے رابطے)۔
- اگر آپ کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ آپ کے بچے کی حالت ہوگی یا اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ کوویڈ کے معاملے میں رابطے میں رہے ہیں۔
- اگر آپ کینیڈا سے باہر قیام کے بعد قرنطین میں ہیں۔

غیر موجودگی میں ، لوگ (بچے اور بڑوں) جو وائرل نما علامات (جیسے بخار ، گلے کی سوزش ، قے ، اسہال ، نزلہ ، فلو ، معدے) کے ساتھ پیش آتے ہیں جب ان میں سے ہر ایک کی حالت میں واپس آسکتے ہیں مندرجہ ذیل سے ملاقات کی جائے گی:

- بخار حل ہونے کے اڑتالیس گھنٹے بعد (بغیر دوا لائے)؛

اور

- دوسری علامات میں اہم اصلاحات کے بعد چار گھنٹے